

GASTROINTESTINAL DISASTER RESPONSE

Thông tin cơ bản:

Con người có thể bị nhiễm bệnh than (anthrax) qua đường ruột khi ăn phải thức ăn bị nhiễm vi khuẩn anthrax. Vi khuẩn anthrax sẽ nhiễm vào đường ruột, gây sưng tấy. Vi khuẩn anthrax cũng có thể nhiễm vào máu. Trong tất cả các dạng anthrax, loại anthrax đường tiêu hóa là khó phát hiện nhất. Nếu không chữa trị nó có thể gây tử vong. Khoảng 25 tới 60 % các trường hợp bị bệnh này dẫn tới tử vong. Anthrax đường tiêu hóa rất hiếm gặp nhưng đã có những đợt dịch bệnh bùng phát ở châu Á và châu Phi. Hầu hết các trường hợp đều do ăn thịt nhiễm vi khuẩn mà chưa nấu kỹ. Chưa có trường hợp nào xảy ra ở Mỹ.

Triệu chứng ban đầu:	Triệu chứng tiếp theo:
<ul style="list-style-type: none">• Các triệu chứng thường xuất hiện trong vòng 7 ngày sau khi nhiễm.• Ăn không ngon• Sốt• Để ý các triệu chứng: sốt, nôn, tiêu chảy và mất nước.	<ul style="list-style-type: none">• Đau bụng• Nôn (có máu)• Tiêu chảy nặng• Đau trong mồm và họng.

Điều trị:

Anthrax đường ruột được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh sẽ giúp trị bệnh nhưng chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ. Hầu hết bệnh nhân sẽ được cho dùng Doxycycline ("Doxy"). Doxy đã được chứng minh là gây ra ít phản ứng phụ hơn các thuốc kháng sinh khác. Nếu bị mắc bệnh khi mang thai, đang cho con bú hoặc bị dị ứng Doxycycline, bệnh nhân sẽ được cho uống Ciprofloxacin ("Cipro"). Cipro có thể gây nhiều phản ứng phụ hơn Doxy, nhưng vẫn an toàn. Cả hai loại thuốc này đều đã được Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực Phẩm của Hoa Kỳ (FDA) duyệt.

Nếu bạn ăn phải thức ăn có nhiễm Anthrax:

- Hãy tới gặp bác sĩ để được khám và điều trị.
- Thuốc kháng sinh sẽ giúp trị bệnh nhưng chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ.
- Uống nhiều nước để bù lượng nước và điện giải bị mất.

