

위장 탄저병 발생시 대응방안 예시

배경지식:

위장탄저병은 오염된 음식이나 흙씨를 통해 탄저균을 섭취함으로써 감염될 수 있습니다. 탄저균은 장을 감염시켜 부풀게 함과 동시에 염증을 일으킵니다. 탄저균 박테리아는 또한 혈류를 통해서도 퍼질 수 있습니다. 모든 종류의 탄저병 중에, 위장 탄저병이 가장 진단하기 어려운 질병입니다. 동시에 치료되지 않으면 치사율이 25-60 퍼센트에 이를 정도로 치명적입니다. 위장 탄저병은 드물지만 아프리카와 아시아 지역에서 창궐한 사례가 있습니다. 대부분의 경우는 익혀지지 않거나, 오염된 육류를 먹어서 발생하였으며, 미국에서는 발생 사례가 보고되지 않았습니니다.

초기 증상:	차후 증상:
<ul style="list-style-type: none"> • 증상은 대개 7 일 이내 나타납니다. • 식욕 부진 • 열 • 아래 증상을 체크해보세요: 열, 구토, 설사, 탈수 	<ul style="list-style-type: none"> • 복통 • 각혈을 동반한 구토 • 심한 설사 • 입 또는 목구멍에 쓰라린 통증
치료:	
<p>위장 탄저병은 항생제를 통해 치료되나, 의료 전문가의 지시를 통해서만 복용되어야 합니다. 대부분은 독시사이클린(Doxy)을 처방받는데, 이는 다른 항생제에 비해 부작용이 거의 없는 것으로 알려져 있습니다. 만약 감염자가 임신상태거나 수유중이거나, 독시사이클린에 알러지 반응이 있는 경우에는 시프로플록사신(시프로)를 처방받습니다. 이는 독시보다 부작용의 확률이 다소 있지만 안전한 약물입니다. 두 약물 모두 미 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 안전한 약물입니다.</p>	
탄저균에 오염된 음식을 먹은 경우:	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 즉각 의료 전문가를 만나 검사받고 치료를 받습니다. <input type="checkbox"/> 항생제를 통해 치료되나, 의료 전문가의 지시를 통해서만 복용되어야 합니다. <input type="checkbox"/> 물을 충분히 마십니다—손실된 체액과 전해질을 보충하는데 매우 중요합니다. 	

